NOTE XXXV.

DEUX ESPÈCES AFRICAINES DE LA FAMILLE DES STAPHYLINIDES.

DÉCRITES PAR

A. FAUVEL.

Hesperus cafioides, nov. spec.

Magnitudine et facie *H. rufipennem* simulans, paulo minus nitidus, magis parallelus magisque depressus, omnino aliter coloratus, pubescentia subtiliore, breviore et densiore, griseola, super elytrorum basin scutellumque subaurata, niger, pedibus piceis, tibiis supra fere omnino, tarsis anticis, intermediis posticisque apice, segmentorum marginibus subtus, anoque summo rufis, antennis multo validioribus, articulis 7—10 fortiter transversis, capite paulo breviore et latiore, punctura subtiliore, undique triplo densiore, fronte media longitudinaliter, disco latius, laevi, punctis tantum duobus inter antennas impressis, lateribus magis parallelis, angulis posticis subtiliter unidentatis, inde ad collum minus arcuatim angustatis; thorace minore, subtrapezoïdali, angulis anticis magis indicatis, aeque ac caput dense fortiterque punctato, spatio sat lato, longitudinali, laevi; scutello crebrius fortiusque quam in *rufipenni* punctato; elytris dorso subplanatis dense sat fortiter subrugosule punctatis, abdomine subtiliter dense punctato, apice licet parcius, supra toto parum irideo, facile distinguendus; ♂ latet. — Long. 8 mill.

Hab. Liberia Africae.

Collection du Muséum de Leyde et la mienne.

Species alia, etiam Africae incola (Stanley Pool, Congo), vicina est: *Hesperus laniger* Fauv. Differt a *cafioide* magnitudine vix majore, corpore paulo minus nitido, pubescentia fulva praelonga etiam super caput et thoracem subhispida, punctura elytrorum abdominisque fortiore et parciore, colore piceo-nigro, antennis circa apicem, ore pedibusque rufis, antennis longioribus, articulis minus transversis, capite, praesertim in ♂, thorace latiore; ♂ capite majore, segmento 7°. ventrali late parum emarginato. — Long. $8^1/_2$ mill.

Je possède deux exemplaires (♂, ♀) du *laniger*; le ♂ est entièrement roux, mais évidemment immature; il est possible même que la ♀ le soit un peu également et que les exemplaires bien développés rappellent la coloration foncée du *cafioides*; mais la pubescence longue et laineuse est caractéristique à première vue.

Ces deux espèces sont les seuls *Hesperus* que je connaisse dans la région éthiopienne, et même en Afrique. Le *rufipennis* Grav. n'a encore été trouvé ni en Barbarie, ni en Egypte.

Caen, Juin 1889.